

Гібриди ярого ріпаку

Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® **PR45H72 (ПР45Г72)** та **PR45H73 (ПР45Г73)** створені традиційним методом селекції без застосування генної інженерії. Ці гібриди придатні до вирощування як за технологією Clearfield® із застосуванням гербіциду Нопасаран® компанії БАСФ, так і за традиційною технологією із застосуванням гербіцидів, які зареєстровані для ріпаку в Україні.

Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® належать до низькоерукового та низькоглюкозинолатного типу (оо-тип); мають високу посухостійкість, добру стійкість до пероноспорозу, бактеріозу, вилягання та осипання, і є придатними до прямого комбайнування завдяки рівномірному достиганню. Гібриди добре реагують на ранні строки посіву та інтенсивну агротехніку. Є придатними до вирощування за технологією No-Till.

Рекомендується:

- висівати з нормою висіву 700 000-800 000 насінин/га, щоб густина перед збиранням становила 450000-500000 рослин/га;

- за технологією No-Till норму висіву насіння необхідно збільшити до 1 млн. насінин на 1 га.

Насіння упаковане в паперові мішки по 2 млн. насінин, з розрахунку на 2,5-2,85 га, протруєно препаратами "Тірам" та Модесто®.



Гібрид	Тип	Веgetаційний період	Висота рослин, см	Рекомендована норма висіву, тис./га насінин	Опт. густина стояння на весні, тис./га рослин
PR45H72	звичайний високорослий	98-100 днів	100-110	700-800	450-500
PR45H73	звичайний високорослий	97-99 днів	100-110	700-801	450-501

Гібриди зернового сорго

Гібриди зернового сорго ПІОНЕР® – **PR88Y20 (ПР88У20)** та **PR88Y41 (ПР88У41/Космосол)** є гідною альтернативою кукурудзі та ярому ячменю (як за урожайністю, так і за прибутковістю виробництва) в регіонах з недостатньою кількістю опадів протягом року (<350 мм). Гібриди характеризуються високою пластичністю при вирощуванні в різних областях півдня України від Бесарабії до Луганщини.

Рекомендується:

- висівати з міжряддями 70 см на глибину 4-5 см з густиною до збирання - 100-120 тис. рослин/га.

- починати посів сорго необхідно, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12-13°C. Посів в непрогрітий ґрунт (7-8°C) призводить до зниження польової схожості насіння.

Насіння сорго упаковане в мішки по 50 фунтів (22,5 кг), що містять до 714 000 насінин.

Насіння протруєно протруйником Максим XL 035 FS та оброблено антидотом S-метолахлору - Концеп III 960 EC, к.е., що надає можливість здійснювати обробіток посіву ПР88У20 проти однорічних злакових та дводольних бур'янів такими гербіцидами: Примекстра TZ Голд 500SC к.с. та Примекстра Голд 720SC к.с.



Гібриди сорго зернового торгової марки ПІОНЕР® на 2015 рік

Гібрид	ФАО	Веgetаційний період	Тип зерна	Вміст таніну	Висота рослин, см	Опт. густина стояння на весні, тис./га рослин
PR88Y20	450	110-115 днів*	білозерний	відсутній	119-121	100-120
PR88Y41	430	103-108 днів*	білозерний	відсутній	115-117	100-120

*За середньостатистичних умов.