

Przygotowanie roztworu inokulantu do pracy.

1. Zaleca się wymieszanie takiej ilości produktu, jaka będzie wykorzystana w ciągu 4-6 godzin.

2. Produkt należy wymieszać z letnią wodą:

- napełnić butelkę do 1/3-1/2 wodą, zapewniając wystarczającą ilość miejsca do wymieszania;
- zamknąć otwór butelki i energicznie wstrząsać, aż cała zawartość utworzy zawiesinę.

Jeżeli wyczuwalny jest wzrost ciśnienia w butelce, odsunąć ją od siebie

i pozwolić na ujście gazu:

- odstawić na co najmniej 10 minut i ponownie wstrząsnąć,
- przelej zawartość butelki do zbiornika w aplikatorze i uzupełnij wodą do wymaganej ilości.

3. W zależności od urządzenia dozującego zastosuj następujące proporcje mieszania

Appli-Pro® C500 / 2000

Minimalne dozowania przy 10 ml / t: użyć koncentratu wymieszanego:

50 t – 0,5 l wody

250 t – 2,5 l wody

Appli-Pro® EZ

Minimalne dozowania 40 ml / t (zalecenie do pras i siewczarni) lub 80 ml / t (zalecenie do przyczep samobierających):

Zmieszaj koncentrat przygotowany z 4-krotnością (opakowanie 50 t – 2 litry wody) lub 8-krotnością ilości wody (opakowanie na 50 t zmieszać z 4 litrami)

Appli-Pro® Basic

Konwencjonalne urządzenie dozujące z systemem mieszania zbiornika: Zalecane dawkowanie z 1 - 2 l / t, wlać odpowiednio do dużego zbiornika wody.

4. Jeżeli wymieszanego produktu nie można wykorzystać w ciągu 6 godzin i trzeba go przechować:

- przelej zawartość zbiornika aplikatora do czystego pojemnika,
- przechować w chłodnym miejscu ze zdjętą nakrętką,
- dzięki ulepszonej formule mrożenie nie jest konieczne, jeżeli wymieszany produkt nie będzie przechowywany dłużej niż 3 dni,
- jeżeli wymieszany produkt będzie zamrażany, pozostawić należy otwarte pojemniki. Na około 24 godziny przed użyciem wyjąć z zamrażalnika i pozwolić, aby produkt odmrażał się powoli w ciepłym pomieszczeniu lub ciepłej (nie gorącej!) kąpieli wodnej.

5. Należy postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta, wykonując płukanie zwrotne i czyszczenie aplikatora.