Mapa prognozowania zagrożenia suchą zgnilizną

W walce z suchą zgnilizną kapustnych ważne jest, aby rozpocząć ją na samym początku choroby. Dlatego dajemy Państwu narzędzie do monitorowania tego zagrożenia – Mapę prognozowania zagrożenia suchą zgnilizną. Dzięki temu narzędziu na bieżąco obserwować można, czy pola rzepaku są zagrożone.

Sucha zgnilizna kapustnych jest chorobą wywoływaną przez grzyby. Objawia się w postaci jasnobrunatnych, czasem również białych plam o owalnym kształcie z brunatną obwódką a na plamach tych występują czarne punkciki – owocniki grzyba. W pełni dojrzałe owocniki uwalniane są w deszczowe dni i rozprzestrzeniają się w powietrzu. W zależności od ich stężenia uzależnione jest prawdopodobieństwo zarażenia.

Najczęściej stosowane środki zwalczania *Phomy* to:

- przestrzeganie płodozmianu,

- orka i niszczenie resztek roślinnych

- wybieranie odmian odpornych zawierających gen Rlm7 takich jak: mieszaniec półkarłowy Pioneer ® PX113, mieszaniec klasyczny Pioneer ® PT271 czy PT298 .

Badanie stężenia zarodników workowych grzybów jest podstawową działalnością Systemu prognozowania epidemii chorób SPEC, na którym oparta jest nasza mapa zagrożeń. Dzięki informacjom dostarczonym przez system każdy rolnik może sam sprawdzić czy w regionie, w którym gospodaruje, istnieje ryzyko pojawienia się suchej zgnilizny kapustnych, a w związku z tym, czy należy wykonać zabieg fungicydowy w uprawianym rzepaku ozimym.



Mapę prognozowania zagrożenia suchą zgnilizną znaleźć można pod adresem:

https://www.e-pole.pl/mapa-prognozowania-zagrozenia-sucha-zgnilizna

Narzędzie to jest dostępne dla uczestników Programu E-pole. Nie masz jeszcze konta? Nie czekaj! Zarejestruj się już teraz i korzystaj ze wszystkich funkcjonalności platformy.