



Ciclo	Finalidade
PRECOCE	GRÃO/SILAGEM
Altura da planta (m)	Altura da espiga (m)
2,50	1,30
GDU florescimento	GDU maturidade fisiológica
860,00	1610,00



PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo com estabilidade
- Boa resposta ao manejo
- Sob adequada condição de manejo, apresenta boa tolerância ao Complexo de Enfezamentos e Viroses
- Boa tolerância ao estresse hídrico em comparação a outros híbridos
- Excelente opção para silagem

RECOMENDAÇÕES

- Evitar o plantio de milho sobre milho
- Observar intervalos de aplicação de Nicosulfuron

TOLERÂNCIA ÀS PRINCIPAIS DOENÇAS¹

Doença	S	MS	MT	T
Ferrugem comum (Puccinia sorghi)	SI			
Ferrugem polissora (Puccinia polysora)				
Mancha-branca				
Mancha de turcicum (Exserohilum turcicum)				
Cercosporiose (Cercospora zea-maydis)				
Enfezamentos (Corn stunt)				

¹Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

POSICIONAMENTO TÉCNICO

	SUL		
ÉPOCA DE PLANTIO	CEDO	NORMAL	TARDIO
POPULAÇÃO DE PLANTAS (MIL PL/HA)	NR	NR	NR

TERRAS BAIXAS < 700M

ÉPOCA DE PLANTIO	CEDO	NORMAL	TARDIO
POPULAÇÃO DE PLANTAS (MIL PL/HA)	65-70	65-70	65-70

TERRAS ALTAS > 700M

ÉPOCA DE PLANTIO	CEDO	NORMAL	TARDIO
POPULAÇÃO DE PLANTAS (MIL PL/HA)	65-70	65-70	65-70

Preferencial Tolerado Não Recomendado

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br

[VOLTAR AO ÍNDICE](#)



Ciclo	Finalidade
PRECOCE	GRÃO/SILAGEM
Altura da planta (m)	Altura da espiga (m)
2,50	1,30
GDU florescimento	GDU maturidade fisiológica
860,00	1610,00

PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo
- Elevada estabilidade
- Boa resposta ao manejo
- Tolera melhor condições de estresse hídrico quando comparado a outros híbridos
- Tolerante ao Complexo de Enfezamentos
- Excelente opção para silagem

RECOMENDAÇÕES

- Evitar o plantio de milho sobre milho
- Observar intervalos de aplicação de Nicosulfuron

TOLERÂNCIA ÀS PRINCIPAIS DOENÇAS¹

Doença	S	MS	MT	T
Ferrugem comum (Puccinia sorghi)	SI			
Ferrugem polissora (Puccinia polysora)				
Mancha branca				
Mancha de turcicum (Exserohilum turcicum)				
Cercosporiose (Cercospora zea-maydis)				
Enfezamentos (Corn stunt)				

¹Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Legendas: **SI** – Sem Informação | **S** – Suscetível | **MS** – Moderadamente Suscetível | **MT** – Moderadamente Tolerante | **T**- Tolerante

POSICIONAMENTO TÉCNICO

SUL			
ÉPOCA DE PLANTIO	CEDO	NORMAL	TARDIO
POPULAÇÃO DE PLANTAS (MIL PL/HA)	60-65	60-65	NR
TERRAS BAIXAS < 700M			
ÉPOCA DE PLANTIO	CEDO	NORMAL	TARDIO
POPULAÇÃO DE PLANTAS (MIL PL/HA)	55-65	50-60	NR
TERRAS ALTAS > 700M			
ÉPOCA DE PLANTIO	CEDO	NORMAL	TARDIO
POPULAÇÃO DE PLANTAS (MIL PL/HA)	60-65	60-65	NR

Preferencial Tolerado Não Recomendado

Nota: Os híbridos e recomendações poderão sofrer alterações em função de necessidades específicas. Para mais informações, consulte o representante comercial da sua região ou acesse: www.pioneersementes.com.br