# AGRONOMIE NAVORSINGSINLIGTING

PIONEER agronomy

## P1225/P1225PW
## Oos

**VRV: 114**
**Dae tot 50% blom: 67 tot 80 (DNP)**
**HE tot 50% blom: 650 tot 760 (DNP)**
**Fisiologies ryp: 120 tot 132 (DNP)**

- Besproeiings platform met uitstekende en stabiele opbrengs potensiaal vir Oostelike en Westelike-produksiestreke.
- Opwindende kort groeiseisoen, geel besproeiingsbaster. 'n Hoë potensiële baster en beskik oor uitstekende aanpasbaarheid en stabiliteit.
- 'n Baster wat koeler omstandighede as P1197-platform kan hanteer.
- Kom baie sterk op en het 'n baie sterk saailing.
- Beskik oor goeie agronomiese eienskappe vir 'n besproeiingsbaster.
- Moet met omsigtigheid as droëland baster aangewend word. Kan vroeg geplant word, asook geskik vir laat aanplantings.
- 'n Enkelkoppige baster wat met optimale toestande goed kan kompenseer.
- Is 'n medium oop raam plant, met meer 'n lang blaarvorm.
- Beskik oor uitstekende graan met hoë skepelmassa.
- Presteer op alle grondtipes en rywydtes.
- Het ook 'n tipe van "stay-green" eienskap.
- Goeie blare vir besproeiings baster, volg nog steeds 'n bespuitings program.
- Aangepas vir enige plantpopulasie, maar nie te hoog nie.
- Besproeiing verkieslik tussen 65,000 en 75,000 plante per hektaar, afhangende van rywydte.

## BELANGRIKE AGRONOMIESE EIENSKAPPE

- Staanvermoë
- Opbrengspotensiaal
- Meerkoppigheid
- Kopplasing
- Droogteverdraagsaamheid
- Afdroging
- Produktiewe spruite

Hoog · Gemiddeld · Laag · Geen data

| | |
|---|---|
| **Meerkoppigheidsindeks** | 1,10 – 1,20 |
| **Saailing groeikrag** | S |
| **Staanvermoë** | S |
| **Planthoogte (m)** | 2,23 – 2,34 |
| **Kophoogte (m)** | 1,18 – 1,26 |
| **Kop-tot-plant (PE) verhouding (%)** | 46 – 52% |
| **Produktiewe spruite (%)** | 11 – 16% |
| **Hektoliter-massa (kg/hl)** | 73 – 76 |
| **Aantal blare** | 20 / 21 |
| **Aantal rye op kop** | 18+ |
| **Pluimkleur** | Wit |
| **Baardkleur** | Pienk |
| **Stronkkleur** | Rooi |

## SIEKTEVERDRAAGSAAMHEID

- Bruinroes
- Grysblaarvlek
- Noordelike blaarskroei
- Stam- en wortelvrot
- Kop- en pluimbrand
- *Fusarium*-kopvrot
- *Diplodia*-kopvrot
- *Gibberella*-kopvrot
- Goss' Bacterial Wilt

Goed · Gemiddeld · Swak · Geen data

**Internal Use Disclaimer:** This document is intended for internal use only. It contains confidential and proprietary information of Corteva Agriscience RSA (Pty) Ltd. Unauthorized distribution, reproduction, or use of this material is strictly prohibited. If you have received this document in error, please notify the sender immediately and destroy all copies of the original message. The foregoing is provided for informational use only. Please contact your Pioneer sales professional for information and suggestions specific to your operation. 2023-2024 data are based on average of all comparisons made over numerous locations throughout 2023-2024. Multi-year and multi-location data are a better predictor of future performance. Do not use these or any other data from a limited number of trials as a significant factor in product selection. Product responses are variable and subject to a variety of environmental, disease, and pest pressures. Individual results may vary.



™ ® SM Trademarks and service marks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.