AGRONOMIE NAVORSINGSINLIGTING

PIONEER agronomy

P1975/P1975PW

VRV: 120
Dae tot 50% blom: 73 tot 82 (DNP)
HE tot 50% blom: 720 tot 800 (DNP)
Fisiologies ryp: 133 tot 145 (DNP)

- Uitstekende en stabiele opbrengspotensiaal vir Oostelike-produksiestreke, in die medium groeiseisoen mark.
- Baster met uitstekende vermoë om tweede kop te maak by goeie toestande, kan kompenseer, het goeie "flex".
- Stoot twee koppe meestal gelyk, maar onder stremming gebruik eerder energie om groter primêre kop te maak.
- Beskik oor baie goeie aanpasbaarheid by hoë potensiale.
- Goeie opbrengs op hoër potensiaal gronde.
- Meer geskik vir gronde met hoër kleipersentasie, bo 20%.
- Pas goed in 'n pakket saam P18380, P2432- en P2362-platforms.
- Nie groot plantraam nie en kophoogte kan laag wees by laer plantpopulasies.
- Goeie blaarsiekte pakket, veral Noordelike Blaarskroei. Bevat Noordelike Blaarskroei geen en toon redelike goeie verdraagsaamheid teen gewone blaarroes.
- Agronomies baie sterk.
- 'n Baster met kleiner pitte, maar met baie goeie skepelmassa.

BELANGRIKE AGRONOMIESE EIENSKAPPE

- Staanvermoë
- Opbrengspotensiaal
- Meerkoppigheid
- Kopplasing
- Droogteverdraagsaamheid
- Afdroging
- Produktiewe spruite

Hoog · Gemiddeld · Laag · Geen data

Meerkoppigheidsindeks	1,18 – 1,35
Saailing groeikrag	A
Staanvermoë	S
Planthoogte (m)	2,18 – 2,26
Kophoogte (m)	1,14 – 1,22
Kop-tot-plant (PE) verhouding (%)	50 – 54%
Produktiewe spruite (%)	7 – 20%
Hektoliter-massa (kg/hl)	73 – 76
Aantal blare	22 / 23
Aantal rye op kop	18+
Pluimkleur	Wit
Baardkleur	Wit
Stronkkleur	Rooi

SIEKTEVERDRAAGSAAMHEID

- Bruinroes
- Grysblaarvlek
- Noordelike blaarskroei
- Stam- en wortelvrot
- Kop- en pluimbrand
- *Fusarium*-kopvrot
- *Diplodia*-kopvrot
- *Gibberella*-kopvrot
- Goss' Bacterial Wilt

Goed · Gemiddeld · Swak · Geen data

Internal Use Disclaimer: This document is intended for internal use only. It contains confidential and proprietary information of Corteva Agriscience RSA (Pty) Ltd. Unauthorized distribution, reproduction, or use of this material is strictly prohibited. If you have received this document in error, please notify the sender immediately and destroy all copies of the original message. The foregoing is provided for informational use only. Please contact your Pioneer sales professional for information and suggestions specific to your operation. 2023-2024 data are based on average of all comparisons made over numerous locations throughout 2023-2024. Multi-year and multi-location data are a better predictor of future performance. Do not use these or any other data from a limited number of trials as a significant factor in product selection. Product responses are variable and subject to a variety of environmental, disease, and pest pressures. Individual results may vary.

™ ® SM Trademarks and service marks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2024 Corteva.